

# گزارش هفتگی اپیدمیولوژی

ترجمه از: کاملیا روحانی  
کارشناس ارشد آموزش پرستاری  
بهداشت جامعه، مربی گروه بهداشت

قاره اقیانوسیه: ۴۸۲۸ نفر که بالاترین میزان آن در استرالیا (۴۲۵۸ نفر) گزارش شده است. آمار گزارش شده در کل دنیا، برابر با ۸۵۱۶۲۸ نفر بوده است.

**موقعیت جاری ویروس HIV در جهان (همه گیری جهانی بیماری ایدز):**

تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۳، جمعاً ۸۵۱۶۲۸ مورد بیماری ایدز در بزرگسالان و کودکان بوسیله سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است. این آمارها به دلیل تعداد موارد گزارش نشده یا تشخیص داده نشده و همچنین تأخیر در گزارشات آماری، تحت تأثیر قرار گرفته اند، لذا تعداد موارد گزارش شده بیماری ایدز با تعداد برآورد شده این بیماری یکسان نیست. بدین ترتیب برآورد می شود که تا به این تاریخ، بیش از ۳ میلیون مورد بیماری ایدز در جهان اتفاق افتاده است. با وجود اینکه در حدود ۱/۴ موارد بیماری ایدز از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است، سازمان بهداشت جهانی برآورد نموده است که بیش از ۳/۴

داده های آماری مربوط به بیماری ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ در پنج قاره جهان، بدین شرح می باشد:

قاره آفریقا: ۳۰۱۸۶۱ نفر که بالاترین میزان آن به ترتیب در تانزانیا (۳۸۷۱۹ نفر) و کنیا (۳۸۲۲۰ نفر) بوده است.


قاره آمریکا: ۴۳۵۹۷۸ نفر که بالاترین میزان آن به ترتیب در ایالات متحده آمریکا (۳۳۹۲۵۰ نفر) و برزیل (۴۳۴۵۵ نفر) بوده است.

قاره آسیا: ۵۵۵۹ نفر که بالاترین میزان آن به ترتیب در تایلند (۳۰۰۱ نفر)، ژاپن (۶۲۱ نفر) و هند (۴۹۴ نفر) بوده است.

بررسی سایر ارقام آماری در این قاره نشان می دهد که آمار ایدز در ایران ۷۳ نفر بوده است.

قاره اروپا: ۱۰۳۴۰۲ نفر که بالاترین میزان آن در فرانسه (۲۶۹۷۰ نفر) و اسپانیا (۲۱۲۰۵ نفر) بوده است.


میزان پیشرفت ۱۴ ساله از پیشرفت: کل در هر دو دوره



منبع: گزارش جهانی وضعیت HIV/AIDS (۱) (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷) - سازمان جهانی بهداشت (WHO)

تعداد پروتوزوئید شش‌شاخه‌ای ابتلا در دنیا: ۳۰۰۰۰۰ نفر


تعداد کزاز پیش‌شده شش‌شاخه‌ای ابتلا در دنیا: ۷۶۱۵۷ نفر



منبع: گزارش جهانی وضعیت HIV/AIDS (۱) (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷) - سازمان جهانی بهداشت (WHO)

مهم‌ترین چالش‌های جهانی پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDS در سال‌های اخیر، افزایش آگاهی و تغییر رفتارهاست. با توجه به مطالب فوق، پیش‌بینی می‌شود که در حال حاضر، شیوع موارد ابتلا به HIV/AIDS در کشورهای در حال توسعه، همچنان بالاست. با توجه به مطالب فوق، پیش‌بینی می‌شود که در حال حاضر، شیوع موارد ابتلا به HIV/AIDS در کشورهای در حال توسعه، همچنان بالاست.

نقشه (۲) توزیع برآورد شده شیوع (۱) عفونت HIV در بزرگسالان را تا انتهای سال ۱۹۹۳ نشان می دهد:



میزان شیوع برآورد شده در کل دنیا: ۱۱-۱۲ میلیون

**پیش بینی می شود که تا  
اواخر سال ۱۹۹۳، بیش از  
۱۴ میلیون بزرگسال و بیش از  
یک میلیون کودک از شروع  
همه گیری جهانی بیماری  
ایدز با ویروس HIV آلوده  
شده اند.**

در همه گیری جهانی عفونت مزمن HIV، چنین برآورد می شود که میزان بروز تقریباً به میزان شیوع نزدیک باشد. البته به دلیل اینکه بسیاری از بیماران مبتلا در اوایل این همه گیری از دنیا رفته اند، در حال حاضر فاصله بین این دو اندازه گیری بیشتر است و با پیشرفت همه گیری جهانی نیز این فاصله عمیق تر می شود.

**طاعون انسانی در سال ۱۹۹۲**

در طول سال ۱۹۹۲، جمعاً ۹ کشور، ۱۵۸۲ مورد طاعون انسانی را (شامل ۱۳۸ مورد مرگ و میر) به سازمان بهداشت جهانی گزارش دادند. در سال ۱۹۹۱، طاعون انسانی بوسیله ۱۰ کشور به تعداد ۱۹۶۶ مورد گزارش شد که از این تعداد، ۱۳۳ مورد تلف شدند.

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال

در قاره آمریکا در سال ۱۹۹۲، ۱۵۸ مورد طاعون انسانی با ۶ مورد مرگ و میر، بوسیله سه کشور گزارش شد که عبارت بودند از: برزیل (۲۵ مورد بیماری)، پرو (۱۲۰ مورد بیماری و ۶ مورد مرگ و میر) و ایالات متحده آمریکا (۱۳ مورد بیماری و ۲ مورد مرگ و میر).

در قاره آسیا، در سال ۱۹۹۲، طاعون انسانی در چهار کشور گزارش شد که عبارت بودند از: چین، مغولستان، میانمار و ویتنام که در کل ۱۰۱۲ مورد بیماری و ۲۶ مورد مرگ و میر اطلاع داده شد.

۱۹۹۲، میزان مرگ و میر ناشی از طاعون انسان ۸/۷٪ بوده، در حالیکه این میزان در ۱۰ سال گذشته، برابر با ۱۰/۴٪ بوده است. در طول سسال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲، جمعاً ۱۴۸۵۶ مورد طاعون انسانی با ۱۴۵۱ مورد مرگ و میر در ۲۱ کشور گزارش شده است. شش کشور برزیل، ماداگاسکار، میانمار (۲)، تانزانیا، ایالات متحده آمریکا و ویتنام، طاعون انسانی را هر سال گزارش کرده اند. بالاترین تعداد موارد طاعون در سال های ۱۹۸۴، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲-۱۹۹۰ گزارش شده است.

لازم به ذکر است که در دهه گذشته (۱۹۹۲-۱۹۸۳)، ۶۱٪ از موارد طاعون انسانی (۷۲۹۰ نفر) و ۷۷٪ از مرگ و میر ناشی از این بیماری (۹۶۱ نفر) از قاره آفریقا گزارش شده است.

تعداد موارد بیماری و تعداد مرگ و میر ناشی از طاعون انسانی در دنیا از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۲ به شرح زیر می باشد:

سال	سال	
۱۹۹۲	۱۹۷۸	
قاره آفریقا		
۴۱۲	۲۰۳	تعداد موارد بیماری
۱۰۶	۱۵	تعداد مرگ و میر
قاره آمریکا		
۱۵۸	۹۷	تعداد موارد بیماری
۶	۵	تعداد مرگ و میر
قاره آسیا		
۱۰۱۲	۴۸۵	تعداد موارد بیماری
۲۶	۱۴	تعداد مرگ و میر
جهان		
۱۵۸۲	۷۸۵	تعداد موارد بیماری
۱۳۸	۳۴	تعداد مرگ و میر

در قاره آفریقا، در سال ۱۹۹۲ طاعون انسانی در دو کشور ماداگاسکار و زئیر با تعداد کل ۴۱۲ مورد گزارش شد که از این تعداد ۱۰۶ مورد تلف شدند.

منبع:

World Health Organization. Weekly Epidemiological Record, No. 2, 14 JAN, 1994. PP: 5-10